

# Neu. FLEXcombo®: So mischen Sie richtig

Bitte berücksichtigen Sie bei der Mischung Folgendes:

**Das Mischen beider Impfstoffe muss sehr sauber erfolgen.**

Die Verwendung einer zusätzlichen sterilen Flasche wird empfohlen. Das Umfüllen geschieht mit Hilfe einer (doppelläufigen) Transfernadel.

**Das Mischen ist ausschließlich bei Ingelvac CircoFLEX® und Ingelvac MycoFLEX® möglich!**

Nur bei diesen beiden Impfstoffen ist die Wirksamkeit der Mischung wissenschaftlich belegt. Die erfolgte Zulassung bedeutet nicht, dass das Mischen von Circo- und Myco-Impfstoffen generell möglich ist.



- ① Ingelvac CircoFLEX® (50 bzw. 10 ml)
- ② Ingelvac MycoFLEX® (50 bzw. 10 ml)
- ③ 1 Transfernadel
- ④ Leere, sterile Flasche (100 ml)
- ⑤ Spritze (2 ml/ID)

Um die 50 Impfdosen korrekt zu mischen, folgen Sie den unten beschriebenen Schritten:

Die Transfernadel auf Ingelvac CircoFLEX® aufstecken.

Das leere Mischbehältnis ebenfalls von oben auf Ingelvac CircoFLEX® aufstecken.

Beide Flaschen um 180 Grad drehen.

**i** **Tipps zur Beschleunigung:**  
Nach dem Verbinden beider Flaschen die Mischflasche kurz auf den Untergrund aufstoßen.  
Die Impfstoffflasche vorsichtig drücken (sonst schäumt es!)

Nach dem vollständigen Umfüllen Ingelvac CircoFLEX® von der Transfernadel trennen, die Transfernadel bleibt auf dem Mischbehältnis.

Ingelvac MycoFLEX® auf die Transfernadel aufstecken. Inhalt aus Ingelvac MycoFLEX® in die Mischflasche überführen.

Anschließend nur die leeren Flaschen entsorgen, nicht die Transfernadel! Diese kann (gereinigt!) mehrfach verwendet werden.

Das Mischbehältnis zur vollständigen Durchmischung leicht schwenken.

**FLEXcombo®  
1 x 2ml**

1 x 2 ml FLEXcombo® intramuskulär injizieren.

**i** Impfstoffe unverzüglich nach dem Anmischen verwenden. Mögliche Reste entsorgen.

Um die 10 Impfdosen korrekt zu mischen, folgen Sie den unten beschriebenen Schritten:

Die Transfernadel auf Ingelvac CircoFLEX® aufstecken.

Ingelvac MycoFLEX® von oben auf Ingelvac CircoFLEX® aufstecken.

Nach dem vollständigen Umfüllen Transfernadel von beiden Flaschen entfernen. Leere Flaschen entsorgen. Transfernadel kann (gereinigt!) mehrfach verwendet werden.

Zur vollständigen Durchmischung Flasche leicht schwenken.

**FLEXcombo®  
1 x 2ml**

1 x 2 ml FLEXcombo® intramuskulär injizieren.